



VOLTAREI A TER VARIZES DEPOIS DO TRATAMENTO?



Por Dr. Mário Vieira
Clínica de Cirurgia Vascular
da Casa de Saúde da Boavista

Para compreender e responder à pergunta que mais ansiedade gera no doente tratado às varizes, sobre o risco de reaparecimento ou recidiva de varizes, é importante compreender a origem da doença.

As varizes são veias doentes, com dilatação por fragilidade das suas paredes, originando refluxo de sangue e troncos varicosos superficiais.

É assim uma doença crónica, indolente e evolutiva. Contudo, a resposta é tranquilizadora: é pouco provável voltar a ter varizes.

O reaparecimento de varizes pode acontecer, até um quarto dos doentes, aos 5 anos após tratamento. Depende do grau da doença na altura do tratamento, a predisposição individual para ter varizes e os cuidados de prevenção após o tratamento. A isso junta-se a necessidade do estudo pormenorizado do grau e mecanismo da insuficiência venosa para que o tratamento seja o mais direto e eficaz possível.

Dessa forma, para evitar a recidiva e recorrência de varizes, é essencial o estudo e tratamento especializado, com o mínimo de agressividade, dirigido à origem da doença. Os cuidados, após o tratamento e o acompanhamento regular, permitem diminuir o risco de reaparecimento e, em caso de recidiva, diagnosticar e tratar o mais precocemente possível com técnicas minimamente invasivas.

Aconselhe-se junto da nossa Clínica de Cirurgia Vascular, que a/o acompanhará em todas as fases da doença venosa. Somos especializados nas mais avançadas técnicas minimamente invasivas para um tratamento precoce, seguro e eficaz de varizes.



Aponte aqui a câmara do seu smartphone para ter acesso directo a todas as informações relativas à nossa clínica de cirurgia vascular. Tratamentos disponíveis, equipa médica, perguntas frequentes e os nossos acordos e convenções disponíveis para si.

